



FUNCIÓN: Fertilizante foliar estimulante de resistencia y calidad.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Potasio	10.00%
Calcio	1100 ppm
Azufre	5.00%
Cobre	2750 ppm
Boro	1.00%
Agentes quelatantes	5.00%
Extractos vegetales y acondicionadores	25.88%
Diluyentes	52.73%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.245 g/ml; pH: 4.91.

FORMULACIÓN: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: **K boron Ca** está diseñado para el fortalecimiento físico y mejoramiento de la calidad de todos los órganos aéreos de las plantas. Contiene inductores de resistencia sistemática que permiten mantener activo y funcional el sistema de defensa interno de las plantas. Sus ingredientes están directamente relacionados con los factores de calidad que determinan la consistencia, color, sabor, firmeza, tamaño, dureza protección física y lignificación, cicatrización y sellado de heridas (K, Ca, Cu, S, B, Silicatos y polifenoles entre otros). **K boron Ca** puede emplearse en cualquier etapa de desarrollo, donde se pretenda promover resistencia física al trasplante, al estrés ambiental, balancear el crecimiento en plantas sobre-vigorizadas por excesos de agua, nitrógeno y temperaturas altas, para prevenir el acame en cereales; o cuando las plantas están sujetas a un fuerte ataque de plagas y enfermedades que dañan la parte aérea.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis	Recomendaciones
Chile, tomate, papa, melón, pepino, sandía, calabacita, brócoli, coliflor, cebolla, arándano, frambuesa, zarzamora, fresa y hortalizas en general y hortalizas en general	1-2 L/ha	Durante el desarrollo y en mezcla con productos para el control de enfermedades. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.
Maíz, sorgo, avena, arroz, trigo y granos y cereales	1 L/ha	En la etapa de elongación de tallos o junto con productos para el control de enfermedades
Frutales en general	2-4 L/ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones
Banano	0.5-1 L/ha	En etapas de desarrollo o junto con productos para el control de enfermedades.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente **K boron Ca**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. Se recomienda aplicar **K boron Ca** en agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo. Aplicación foliar.

INCOMPATIBILIDAD: **K boron Ca** es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **K boron Ca** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendables en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

